

( , 2009).

*S. crenata*

*S. hypericifolia*

*Spiraea crenata*

*S. hypericifolia*

, *S. hypericifolia* *S. crenata*

632.112:582.47(477.63)

• • • • •

• • • • •

-

,  
 .  
 ,  
 .  
 —  
 .  
 ,  
 . « » ,  
 ,  
 ,  
 .  
 28 . / . 2,0 -  
 . 2  
 . .  
 .  
 70 ° , —  
 . « » .  
 50 ° .  
 55 ° 60 ° . 35 °  
 ,  
 — 3 10 % .  
 45 ° (70 %),  
 (52 %), . « » (48 %).  
 25 % 20 % ,  
 — 7 % . 40 ° 10 % ,  
 45 ° — 45 % , 50 ° .  
 35–40°  
 . 45 °  
 30 % ,  
 50 55 % , —  
 15 % 25 % . « » 35 %  
 , 55 ° :  
 . « » ,  
 ,  
 . « » 60 ° .  
 — 55 ° .

– 70 ° , –  
 (65 ° ).  
 . « » , 60 ° .  
 , 65 ° .  
 .  
 ,  
 – , –  
 .

582. 32. + 662.271.4

**CERATODON PURPUREUS (HEDW.) BRID.**

• „ . . . „ . . . .  
 • „ . . . „ . . . .

,  
 , ( , 2006).  
 ( , , )  
 -  
 ( , , , 2014). ,  
 .  
 , , ( , ,  
 , , 2006).  
 ,  
 ,  
 ,  
 .

*Ceratodon purpureus* (Hedw.) Brid.