



# ВІСНИК

## дніпропетровського університету

2017

Т 24

№ 6/1

Серія

МАТЕМАТИКА

Випуск 22

# ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Науковий журнал

---

№ 6/1

Том 24

2017

---

## РЕДАКЦІЙНА РАДА:

чл.-кор. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф. **М. В. Поляков** (*голова редакційної ради*); старш. наук. співроб., проф. **В.І. Карплюк** (*заст. голови*); акад. Академії наук ВО України, д-р фіз.-мат. наук, проф. **О.О. Кочубей**; д-р хім. наук, проф. **В. Ф. Варгалюк**; чл.-кор. АПН України, д-р філос. наук, проф. **П. І. Гнатенко**; д-р фіз.-мат. наук, проф. **О.Г. Гоман**; д-р філол. наук, проф. **В. Д. Демченко**; д-р техн. наук, проф. **А.П.Дзюба**; д-р пед. наук, проф. **Л.І. Зеленська**; чл.-кор. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф. **В.П. Моторний**; чл.-кор АПН України, д-р психол. наук, проф. **Е. Л. Носенко**; д-р біол. наук, проф. **О.Є. Пахомов**; д-р філол. наук, проф. **Т.С. Пристайко**; д-р іст. наук, проф. **С.І. Світленко**; акад. Академії наук ВО України, д-р фіз.-мат. наук, проф. **В. В. Скалезуб**; д-р філол. наук, проф. **О.С. Токовенко**; д-р екон. наук, проф. **Н.І. Дучинська**; д-р філол. наук, проф. **I.С. Попова**; д-р техн. наук, проф. **Ю.Д. Шептун**; ректор Європейської школи та управління проф. **Вятр Єжи Йозеф** (Польща); д-р фіз.-мат. наук, проф. **Ю. Мельников** (США)

---

Серія: МАТЕМАТИКА  
Випуск 22

Дніпро  
Дніпропетровський національний  
університет імені Олеся Гончара

Надруковано за рішенням вченої ради Дніпропетровського національного університету згідно із затвердженим планом видань на 2017 р.

**Рецензенти:**

д-р фіз.-мат. наук, проф. М.П. Тіман  
д-р фіз.-мат. наук, проф. В.В. Лобода

Викладено результати досліджень із питань алгебри, теорії наближень функцій дійсної змінної, рівнянь математичної фізики, а також їх застосування для розвязання задач.

Для наукових співробітників, аспірантів і студентів старших курсів.

Изложены результаты исследований по вопросам алгебры, теории приближений функций действительной переменной, уравнений математической физики, а также их применения к решению задач.

Для научных сотрудников, аспирантов и студентов старших курсов.

**Редакційна колегія:**

чл.-кор. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф. **В.П. Моторний** (відп. ред.); акад. Академії наук ВО України, д-р фіз.-мат. наук, проф. **В.Ф. Бабенко**; д-р фіз.-мат. наук, проф. **П.І. Когут**; проф. **К.А. Копатун** (Канада); д-р фіз.-мат. наук, проф. **В.О. Кофанов**; д-р фіз.-мат. наук, проф. **Л.А. Курдаченко**; чл.-кор. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф. **М.В. Поляков**; д-р фіз.-мат. наук, проф. **А.В. Тушев**; д-р фіз.-мат. наук, проф. **I.O. Шевчук**; канд. фіз.-мат. наук, доц. **Н.В. Парфіонович**; канд. фіз.-мат. наук, доц. **О.О. Руденко** (відп. секретар)

УДК 517.5

Б. Г. Пелешенко\*, Т. М. Семиренко\*\*

\* Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,  
Дніпро, 49600. E-mail: [dsaupelesh@mail.ru](mailto:dsaupelesh@mail.ru)

\*\* Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,  
Дніпро, 49600. E-mail: [semirenko@mail.ru](mailto:semirenko@mail.ru)

## Сліди узагальнених потенціалів

Одержана теорема про знаходження слідів інтегральних операторів, визначених на симетричних просторах з деяким ядром з застосуванням теореми інтерполяції Крейна-Семенова.

*Ключові слова:* міра, функція розподілу, перестановка функції, симетричний простір, інтерполяція операторів.

Получена теорема о нахождении следов интегральных операторов, определенных на симметричных пространствах с некоторым ядром с применением теоремы интерполяции Крейна-Семенова.

*Ключевые слова:* мера, функция распределения, перестановка функции, симметричное пространство, интерполяция операторов.

The theorem on finding traces of integral operators defined on a symmetric space with a certain kernel is obtained using the Krein-Semenov interpolation theorem.

*Key words:* measure, distribution function, function permutation, symmetric space, operators interpolation.

Узагальнюються деякі результати статті Петре [1], який застосував інтерполяцію лінійних операторів в лебегових просторах для знаходження слідів потенціалів Pica. В цій статті Петре показав, що теореми типу Адамса [2] про сліди потенціалів можна доводити використовуючи теорію інтерполяції. Замість інтерполяції Петре в роботі використовується теорема інтерполяції лінійних операторів Крейна, Семенова в симетричних просторах [3].

Нехай через  $\bar{E}(0, \infty)$  позначається симетричний простір функцій, заданих на півпрямій  $(0, \infty)$ , з фундаментальною функцією  $\phi_E(t)$ ,  $0 < t < \infty$  [3].

Через  $X$  позначимо простір з додатною мірою  $\mu$ .

Для кожної вимірної за мірою  $\mu$  на  $X$  функції  $f$  через

$$\mu_f(t) =: \mu \{x \in X : f(x) > t\} \quad (t > 0)$$

позначається функція розподілу і через  $f_\mu^*$  позначається незростаюча перестановка цієї функції, яка задана на  $(0, \infty)$ , тобто  $f_\mu^*(s) =: \inf \{t \in (0, \infty) : \mu_f(t) < s\}$ . Далі, через  $E(X)$  позначається симетричний простір вимірних за мірою  $\mu$  на  $X$  функцій з скінченою нормою

$$\|f\|_{E(X)} := \|f_\mu^*\|_{\bar{E}(0, \infty)}.$$

Для додатних вимірних за мірою Лебега на  $(0, \infty)$  функцій  $\chi(t)$ ,  $\delta(t)$  через  $E_{\chi, \delta}(0, \infty)$  позначимо простір вимірних за мірою  $\mu$  на  $X$  функцій  $f$  таких, що норма  $\|\chi(t)f_\mu^{**}(\delta(t))\|_{\bar{E}(0, \infty)}$  скінчена. Тут  $f_\mu^{**}(t) = \frac{1}{t} \int_0^t f_\mu^*(\tau) d\tau$  ( $0 < t < \infty$ ).

Нехай  $X, Y$  - простори з відповідно додатними мірами  $\mu$  і  $\nu$ . Позначимо  $L_p^X = L_p(X)$ ,  $L_q^Y = L_q(Y)$ ,  $E^X = E(X)$ ,  $F^Y = F(Y)$  - відповідно простори Лебега та симетричні простори.

Симетричними просторами, заданими на  $X, Y$ , є простори Лоренця  $\Lambda^X = \Lambda(X)$ , Марцинкевича  $M^Y = M(Y)$  відповідно з мірами  $\nu$ ,  $\mu$  та нормами  $\|f\|_{\Lambda(X)} := \|f_\mu^*\|_{\bar{\Lambda}_\phi(0, \infty)}$ ,  $\|f\|_{M(Y)} := \|f_\nu^*\|_{\bar{M}_\psi(0, \infty)}$ . Тут через  $\phi$ ,  $\psi$  позначені відповідно фундаментальні функції, задані на півосі  $(0, \infty)$  просторів Лоренця  $\bar{\Lambda}\phi(0, \infty)$  та Марцинкевича  $\bar{M}_\psi(0, \infty)$ .

Нехай через  $\bar{E}'(0, \infty)$  позначається симетричний простір, асоційований до простору  $\bar{E}(0, \infty)$ . Позначимо через  $E'(X)$  симетричний простір, асоційований до простору  $E(X)$ , такий, що  $\|f\|_{E'(X)} := \|f_\mu^*\|_{\bar{E}'(0, \infty)}$ , де фундаментальна функція простору  $\bar{E}'(0, \infty)$  позначається через  $\phi_{\bar{E}'}(t) = \frac{t}{\phi_{\bar{E}}(t)}$ .

Нехай через  $L_p^X(G)$  та  $L_q^Y(G)$  позначаються простори Лебега в випадку, коли  $G$  - симетричний простір, тобто простір всіх функцій  $g(u)$  із значеннями в  $G$  і таких, що  $\|g(u)\|_G \in L_p^X$  або  $\|g(u)\|_G \in L_q^Y$  з відповідними нормами  $\|g\|_{L_p^X(G)} = \|\|g(u)\|_G\|_{L_p^X}$  або  $\|g\|_{L_q^Y(G)} = \|\|g(u)\|_G\|_{L_q^Y}$ .

Розглянемо оператор  $Tf(y) = \int_X k(y, x)f(x)d\mu(x)$ , де ядро  $k \in (\mu, \nu)$  - вимірна функція і  $(Tf)_\nu^{**}(t) = \frac{1}{t} \int_0^\infty (Tf)_\nu^*(\tau)d\tau$ .

Сформулюємо перше твердження.

**Теорема 1.** Нехай

$$k \in L_\infty^Y(E^X), k \in L_\infty^X(F^Y) \quad (0.1)$$

і показники розтягування фундаментальних функцій  $\phi_{\bar{E}}$ ,  $\phi_{\bar{F}}$  задоволюють нерівностям  $0 < \gamma_{\phi_{\bar{E}}} \leq \delta_{\phi_{\bar{E}}} < 1$ ,  $0 < \gamma_{\phi_{\bar{F}}} \leq \delta_{\phi_{\bar{F}}} < 1$ .

Нехай  $G^X$  - такий симетричний простір з нормою  $\|f\|_{G^X} := \|f_\mu^*\|_{\bar{G}(0, \infty)}$ , що для показників розтягування фундаментальної функції  $\phi_{\bar{G}}$  простору  $\bar{G}(0, \infty)$  виконується нерівність  $\delta_{\phi_{\bar{E}'}} < \gamma_{\phi_{\bar{G}}} \leq \delta_{\phi_{\bar{G}}} < 1$ .

Тоді існує така стала  $C > 0$ , що для всіх  $f \in G^X$  виконується нерівність

$$\|(Tf)_\nu^{**}\|_{\bar{G}_{\nu, \delta}(0, \infty)} \leq C \|f_\mu^*\|_{\bar{G}(0, \infty)},$$

$$\text{де } \chi(t) = \frac{\phi_E(t)}{t}, \delta(t) = \phi_F^{-1}(\phi_E(t)).$$

**Доведення.** Нехай  $f \in (E')^X$ . Застосовуючи нерівність Гельдера для симетричних просторів [1], маємо  $\left| \int_X k(y, x)f(x)d\mu(x) \right| \leq C \|k_y\|_{E^X} \|f\|_{(E')^X}$ . Потім візьмемо

$L_\infty$  - норму від лівої та правої частини нерівності та використаємо умову (0.1) теореми. Одержано

$$\begin{aligned} \|(Tf)_\nu^{**}\|_{L_\infty(0,\infty)} &\leq \|(Tf)_\nu^*\|_{L_\infty(0,\infty)} = \|Tf\|_{L_\infty^Y} = \left\| \int_X k(y, x) f(x) d\mu(x) \right\|_{L_\infty^Y} \leq \\ &\leq C \|k_y\|_{E^X} \|f\|_{(E')^X} \leq C \|f_\mu^*\|_{\tilde{E}'(0,\infty)}. \end{aligned}$$

Нехай  $f \in L_\infty^X$ . Далі застосуємо аналог нерівності Мінковського [3] до норми симетричного простору  $F^Y$ , маємо

$$\left\| \int_X k(\cdot, x) f(x) d\mu(x) \right\|_{F^Y} \leq C \int_X \|k(\cdot, x)\|_{F^Y} |f(x)| d\mu(x).$$

Використовуючи нерівність  $0 < \gamma_{\phi_{\bar{F}}} \leq \delta_{\phi_{\bar{F}}} < 1$  для  $\phi_{\bar{F}}$  і теорему 5.3 із [3], маємо

$$\sup_{0 < t < \infty} (Tf)_\nu^{**}(t) \phi_{\bar{F}}(t) \leq \|(Tf)_\nu^*\|_{\bar{F}(0,\infty)} = \|Tf\|_{F^Y} \leq C \|k(\cdot, x)\|_{F^Y} \|f\|_{L_1^X} \leq C \|f_\mu^*\|_{\tilde{L}_1(0,\infty)}.$$

Застосовуючи інтерполяційну теорему Крейна і Семенова [3], одержуємо, що

$$\|(Tf)_\nu^{**}\|_{\tilde{G}_{\gamma, \delta}(0,\infty)} \leq C \|f_\mu^*\|_{\tilde{G}(0,\infty)}.$$

Нехай  $X = Y = \mathbb{R}^n$ . Додатна міра  $\mu$  на  $\mathbb{R}^n$  є розмірності  $a$ , якщо для будь-якої кулі  $K_r$  радіуса  $r$  виконується нерівність

$$\mu(K_r) \leq C(\mu) r^a,$$

а стала  $C(\mu)$  залежить тільки від  $\mu$ . Нехай  $k(y, x) = \frac{1}{g(|x-y|)}$ , де  $g : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ ,  $g(0) = 0$ ,  $0 < \gamma_g \leq \delta_g < n$  і  $g$  зростає.

Для міри  $\mu$  позначимо символом  $G_E^g(\mu)$  простір функцій  $u$ , поданих у вигляді  $u(y) = \int k(y, x) f(x) dx$ , де функція  $f \in E(\mu)$ .

Покладемо  $u_\nu^{**}(t) = \frac{1}{t} \int_0^t u_\nu^*(\tau) d\tau$ . Має місце наступна теорема.

**Теорема 2.** Нехай  $X = Y = \mathbb{R}^n$ ,  $\mu$  є міра розмірності  $a$ , міра  $\nu$  - розмірності  $b$  і показники розтягування фундаментальної функції  $g$  задовільняють нерівність  $0 < \gamma_g \leq \delta_g < a$ . Нехай  $\phi(t) = \frac{t}{g(t^\frac{1}{a})}$  для  $t > 0$  і  $\phi(0) = 0$ ,  $\tilde{G}(0, \infty)$  - такий симетричний простір, що для показників розтягування фундаментальної функції  $\phi_{\tilde{G}}$  цього простору виконується нерівність  $\delta_\phi < \gamma_{\phi_{\tilde{G}}} \leq \delta_{\phi_{\tilde{G}}} < 1$ . Якщо з нормами  $\|f\|_{G^X} := \|f_\mu^*\|_{\tilde{G}(0,\infty)}$  та  $\|u\|_{\tilde{G}^Y} := \left\| g\left(t^{\frac{1}{a}}\right) t^{-1}(u)^{**}\left(t^{\frac{b}{a}}\right) \right\|_{\tilde{G}(0,\infty)}$ , то існує така стала  $C > 0$ , що для всякої  $f \in G^X$  виконується нерівність

$$\left\| g\left(t^{\frac{1}{a}}\right) t^{-1}(u)^{**}\left(t^{\frac{b}{a}}\right) \right\|_{\tilde{G}(0,\infty)} \leq C \|f_\mu^*(t)\|_{\tilde{G}(0,\infty)}.$$

**Доведення.** Нехай  $\mu$  - міра розмірності  $a$ ,  $\nu$  - міра розмірності  $b$  і коефіцієнти розтягування функції  $g$  задовольняють нерівність  $0 < \gamma_g \leq \delta_g < a$ . Тоді  $0 < \gamma_\phi \leq \delta_\phi < 1$ . Для кожного  $x \in X$  позначимо через  $\nu_{k_x}(\tau)$  функцію розподілу функції  $k(y, x)$  по змінній  $y$ , тобто

$$\nu_{k_x}(\tau) =: \nu \{y \in Y : k(y, x) > \tau\} \quad (\tau > 0).$$

Через  $k_x^*(s)$  позначається незростаюча перестановка  $k(y, x)$  по змінній  $y$ :

$$k_x^*(s) =: \inf \{\tau \in (0, \infty) : \nu_{k_x}(\tau) < s\},$$

якщо змінна  $x$  фіксована. Аналогічно визначається функція розподілу  $\mu_{k_y}(\tau)$  та незростаюча перестановка  $k_y^*(h)$  функції  $k(y, x)$  по змінній  $x$ , якщо змінна  $y$  фіксована.

Спочатку доведемо, що  $k(x, y) = \frac{1}{g(|x-y|)}$  належить простору Марцинкевича  $M^X$  з нормою  $\|k(\cdot, y)\|_{M(X)} := \|k_y^*\|_{\bar{M}_\phi(0, \infty)}$  і фундаментальною функцією  $\bar{\phi}(\tau)$  простору  $\bar{M}_\phi(0, \infty)$ , еквівалентною функції  $g\left(\tau^{\frac{1}{a}}\right)$  для всякого  $y$ .

Для цього достатньо встановити, що  $\mu \left\{ x \in X : \frac{1}{g(|y-x|)} > \tau \right\} \leq C(a) (g^{-1}(\frac{1}{\tau}))^a$ . Із нерівності  $\frac{1}{g(|y-x|)} > \tau$  маємо  $|y-x| < g^{-1}(\frac{1}{\tau})$ . Так як  $\mu$  - міра розмірності  $a$ , то згідно визначення  $\mu \left\{ x \in X : \frac{1}{g(|y-x|)} > \tau \right\}$  не більше за  $C(a) (g^{-1}(\frac{1}{\tau}))^a$ , де стала  $C(a)$  залежить тільки від  $a$ . Отже, незростаюча перестановка  $k_y^*(\tau)$ , яка задана на  $(0, \infty)$ , функції  $k(x, y) = \frac{1}{g(|y-x|)}$  для всякого  $y \in Y$  мажорується  $\phi_1(t) = \left[ g\left(\left(\frac{t}{C(a)}\right)^{\frac{1}{a}}\right) \right]^{-1}$ . Враховуючи властивості функцій  $g$ ,  $\phi$  і теорему 5.3 з [3], одержуємо, що  $k(y, \cdot) \in M^X$  з нормою  $\|k(y, \cdot)\|_{M^X} := \|k_y^*\|_{\bar{M}_{[\phi_1]^{-1}(0, \infty)}}$ , що є еквівалентною  $\sup_{\tau>0} k_y^{**}(\tau) \left[ g\left(\tau^{\frac{1}{a}}\right) \right]$  для кожного  $y \in Y$ , де  $\bar{\phi}(\tau) = g\left(\tau^{\frac{1}{a}}\right)$  - фундаментальна функція простору Марцинкевича  $\bar{M}_\phi(0, \infty)$ .

Аналогічно доводиться, що незростаюча перестановка  $k_x^*(t)$ , яка задана на  $(0, \infty)$ , для всякого  $x \in X$  мажорується функцією  $\psi_1(t) = \left[ g\left(\left(\frac{t}{C(b)}\right)^{\frac{1}{b}}\right) \right]^{-1}$  і  $k(\cdot, x) \in M^Y$ . Норма  $\|k(\cdot, x)\|_{M^Y} := \|k_x^*\|_{\bar{M}_{[\psi_1]^{-1}(0, \infty)}}$  для всякого  $x \in X$  еквівалентна  $\sup_{\tau>0} k_x^{**}(\tau) \left[ g\left(\tau^{\frac{1}{b}}\right) \right]$ , де  $\bar{\psi}(t) = g\left(t^{\frac{1}{b}}\right)$  - фундаментальна функція простору  $\bar{M}_\psi(0, \infty)$ .

Відмітимо, що двоїстим простором до простору Марцинкевича  $M^X$ , з мірою  $\mu$  і з нормою  $\|f\|_{M^X} := \|f_\mu^*\| \bar{M}_\phi(0, \infty)$  та фундаментальною функцією  $\bar{\phi}(\tau) = g\left(\tau^{\frac{1}{a}}\right)$  простору  $\bar{M}_\phi(0, \infty)$  є простір Лоренця  $\Lambda^X$  з нормою  $\|f\|_{\Lambda^X} := \|f_\mu^*\|_{\bar{\Lambda}_\phi(0, \infty)}$  і фундаментальною функцією  $\phi(t) = \frac{t}{\phi(t)}$  простору  $\bar{\Lambda}_\phi(0, \infty)$ . Крім того,  $\delta(t)$ ,  $\gamma(t)$  визначаються з умови  $\frac{\phi(t)}{t} = \frac{1}{\psi(\delta(t))}$ ,  $\gamma(t) = \frac{\bar{\psi}(\delta(t))}{t}$  або з умови  $\bar{\phi}(t) = \bar{\psi}(\delta(t))$ ,  $\gamma(t) =$

$\frac{\bar{\psi}(\delta(t))}{t}$ . Звідси маємо  $\delta(t) = t^{\frac{b}{a}}$ ,  $\mathcal{N}(t) = \frac{\bar{\phi}(t)}{t} = \frac{1}{t}g\left(t^{\frac{1}{a}}\right)$  з врахуванням залежності  $\bar{\phi}, \bar{\psi}$  від  $t$ . Застосовуючи теорему 1 у випадку  $E^X = M^X$ ,  $F^Y = M^Y$ , одержуємо нерівність  $\left\|g\left(t^{\frac{1}{a}}\right)t^{-1}(u)^{**}\left(t^{\frac{b}{a}}\right)\right\|_{\tilde{G}(0,\infty)} \leq C \|f^*\|_{\tilde{G}(0,\infty)}$ .

**Наслідок.** Нехай  $X = Y = R^n$ ,  $\mu$  є міра розмірності  $a$ , міра  $\nu$  - розмірності  $b$ ;  $g(t) = t^{n-\alpha}$ , де  $0 < \alpha < n$ . Нехай  $L_p(0, \infty)$ , де  $p > 1$  - простір Лебега і  $L_{q,p}(0, \infty)$  - простір функцій  $h(t)$  з нормою  $\|h\|_{L_{q,p}(0,\infty)} = \left\{q^{-2}(q-1) \int_0^\infty [h^{**}(t)]^p t^{\frac{p}{q}-1} dt\right\}^{\frac{1}{p}}$ . Якщо  $L_p^X = L_p(X)$  та  $L_{q,p}^Y = L_{q,p}(Y)$  - простори відповідно з нормами  $\|f\|_{L_p^X} := \|f_\mu^*\|_{L_p(0,\infty)}$  та  $\|u\|_{L_{q,p}^Y} := \|u_\nu^*\|_{L_{q,p}(0,\infty)}$ , і  $n - \alpha = \frac{a}{p'} + \frac{b}{q}$  ( $p' = \frac{p}{p-1}$ ), то існує така стала  $C > 0$ , що для всякої  $f \in L_p^X$  виконується нерівність

$$\|u_\nu^*\|_{L_{q,p}(0,\infty)} \leq C \|f_\mu^*(t)\|_{L_p(0,\infty)}.$$

**Доведення.** Застосовуючи теорему 2 в випадку, коли  $G^Y = L_p^Y$ , маємо нерівність:

$$\left\|t^{\frac{n-\alpha}{a}}t^{-1}(u)^{**}\left(t^{\frac{b}{a}}\right)\right\|_{L_p(0,\infty)} \leq C \|f^*\|_{L_p(0,\infty)}.$$

Спочатку в лівій частині цієї нерівності запишемо норму в  $L_p(0, \infty)$ :

$$\left\{\int_0^\infty \left(t^{\frac{n-\alpha}{a}-1}(u)^{**}\left(t^{\frac{b}{a}}\right)\right)^p dt\right\}^{\frac{1}{p}} \leq C \|f^*\|_{L_p(0,\infty)}.$$

Потім зробимо заміну  $t^{\frac{b}{a}} = \tau$  і маємо:

$$\left\{\frac{a}{b} \int_0^\infty ((u)^{**}(\tau))^p \tau^{\frac{n-\alpha}{b}p - \frac{a}{b}p} \tau^{\frac{a}{b}-1} d\tau\right\}^{\frac{1}{p}} \leq C \|f^*\|_{L_p(0,\infty)}.$$

Замінивши  $\frac{1}{q} = \frac{n-\alpha}{b} - \frac{a}{bp'}$ , одержимо наслідок.

### Бібліографічні посилання

1. Peetre J. On the trace of potentials [Text] /J. Peetre //Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa –1975. –№2. –P. 33-43.
2. Adams D. R. Traces of potentials arising from translation invariant operators [Text] /D. R. Adams //Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa –1971. –№25. –P. 203-217.
3. Крейн С. Г. Интерполяция линейных операторов [Текст]/ С. Г. Крейн, Ю. И. Петунин, Е. М. Семенов. - М.: Наука, 1978.- 400 с.