

ПОДОДЕРМАТИТ КРОЛІВ

Тішкіна Н.М., Суслова Н.І., Сапронова В.О.

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро,
Україна, tishkina1071@gmail.com

Пододерматит (виразковий пододерматит, bumblefoot) – глибоке хронічне запалення шкіри та нижче розташованих тканин у дистальній ділянці кінцівки, яке часто зустрічається у кролів та інших видів гризунів. Виникнення захворювання досить часто пов'язане з умовами утримання тварин, яке на пізніх стадіях потребує комплексної паліативної терапії.

У кролів у класичному розумінні це не є дерматологічною хворобою і потребує спільної роботи ветеринарного спеціаліста й власника тварини. До факторів, які провокують виникнення хвороби за літературними даними є: породна особливість (кролі породи рекс); надлишкова вага тіла; гіподинамія; некоректно підібрана підстилка та порушення санітарних норм утримання тварин, а також травми, сторонні тіла м'яких тканин та інше.

Матеріалом дослідження були хворі на пододерматит кролі віком 1-4 роки, які утримувалися в умовах віварію факультету ветеринарної медицини Дніпровського аграрно-економічного університету. Методи дослідження – загальноклінічні. Тварини утримувалися в індивідуальних клітках з решітчастою підлогою та піддоном. Годівля – сіно та овочі з вільним доступом до води. Серед 12 обстежених кролів, які утримувалися в віварії, виявлено трьох тварин з ознаками пододерматиту – самиця та кріль породи метелик 1-1, 5 річного віку та 1 кролиця породи сірий великан чотирьох річного віку. У досліджених тварин виявили ожиріння, малорухливий спосіб життя внаслідок незначних розмірів кліток двох тварин 1-1, 5 річного віку виявлено характерні ознаки легкого перебігу хвороби - відсутність шерсті на плантарній поверхні плесни та наявність почервоніння (еритеми) округлої форми, та ще в одній самки чотирьох річного віку – еритеми з виразками, при натисканні з яких виділявся серозний ексудат, що характерно для помірного пододерматиту.

Прогноз для всіх тварин є благоприємний. Тваринам потрібна комплексна терапія з обов'язковою корекцією провокативних факторів: контроль за ожирінням; усунення факторів, які призводять

до виникнення захворювання; усунення тиску на уражену ділянку шкіри; усунення інфекційного процесу.

Лікування тварин з діагнозом «виразковий пододерматит» включало: покращення умов утримання тварин; місцеву обробку уражених ділянок двічі на день 0,025 %-им розчином хлоргексидину з наступним зрошенням дезі-спреєм (розчином окситетрацикліну) протягом 10 днів з використанням фіранкових пов'язок для зниження тиску на уражені ділянки шкіри.

Для профілактики доглядачам тварин запропоновано за можливості покращити умови утримання тварин, збільшити кількість грубих кормів у раціоні, періодично проводити клінічний огляд тварин для запобігання повторному виникненню захворювання.